

# Logica

## 1.5: Teoria Assomatica degli Insiemi (cenni)

Claudio Sacerdoti Coen

`<sacerdot@cs.unibo.it>`

Università di Bologna

03/10/2019

## Paradosso di Russell

Sia  $X = \{Y \mid Y \notin Y\}$

$X \in X$  sse  $X \notin X$

- Il paradosso mostra che la teoria naif degli insiemi porta a inconsistenza logica
- La teoria naif usa l'**assioma di comprensione**: per ogni proprietà  $P$  si può formare  $\{x \mid P(x)\}$
- Serve una teoria che rimuova l'assioma di comprensione
- Serva una teoria che controlli l'uso meta-linguistico
  - $X$  non deve essere un insieme ma una **classe** perchè "troppo grande"
  - certe collezioni di insiemi devono essere insiemi

# Teorie assiomatiche degli insiemi: preliminari

In una teoria assiomatica degli insiemi:

- 1 I concetti di **insieme**, **appartenenza** e **uguaglianza** non vengono definiti (gli insiemi sono enti primitivi: definire un insieme come una collezione, definita come un gruppo, etc. non serve a nulla)
- 2 Usiamo **assiomi** per asserire l'esistenza di alcuni insiemi a partire da altri
- 3 Ci sono **numerose teorie insiemistiche** che differiscono riguardo agli assiomi
- 4 Noi seguiremo la teoria di **Zermelo-Fraenkel (ZF)** che è la meno controversa ed è già sufficiente per sviluppare la maggior parte della matematica
- 5 ZF non è mai stata dimostrata essere consistente

## Assioma di estensionalità

Due insiemi sono uguali sse hanno gli stessi elementi.

$$\forall X, \forall Y, (X = Y \iff \forall Z. (Z \in X \iff Z \in Y))$$

## Definizione di essere sottoinsieme

$X$  è sottoinsieme di  $Y$  se  $Y$  possiede tutti gli elementi di  $X$

$$X \subseteq Y \stackrel{\text{def}}{=} \forall Z, (Z \in X \Rightarrow Z \in Y)$$

## Assioma di separazione

Dato un insieme, possiamo formare il sottoinsieme dei suoi elementi che soddisfano una proprietà

$$\forall X, \exists Y, \forall Z, (Z \in Y \iff Z \in X \wedge P(Z))$$

Indichiamo tale  $Y$  come  $\{Z \in X \mid P(Z)\}$

Per usare l'assioma di separazione per riprodurre il paradosso di Russell servirebbe un insieme  $U$  che contenesse tutti gli altri insiemi:

$$X = \{Y \in U \mid Y \notin Y\}$$

Nessun assioma asserirà che  $U$  esista: la collezione di tutti gli insiemi è una classe propria (cioè una classe che NON è un insieme).

## Assioma dell'insieme vuoto

$$\exists X, \forall Z, Z \notin X$$

L'insieme  $X$  viene indicato come  $\emptyset$

## Definizione dell'insieme vuoto

L'assioma è ridondante. Sia  $Y$  un qualunque altro insieme di cui un assioma asserisce l'esistenza (vedi p.e. assioma dell'infinito).

$$\emptyset \stackrel{\text{def}}{=} \{X \in Y \mid \text{false}\}$$

## Definizione di intersezione binaria

$$A \cap B \stackrel{\text{def}}{=} \{X \in A \mid X \in B\}$$

## Teorema

$$X \in A \cap B \iff X \in A \wedge X \in B$$

## Definizione di intersezione

$$\bigcap F \stackrel{\text{def}}{=} \emptyset \text{ se } F = \emptyset$$

$$\bigcap F \stackrel{\text{def}}{=} \{X \in A \mid \forall Y, (Y \in F \Rightarrow X \in Y)\} \text{ dove } A \in F$$

La definizione non dipende dall' $A$  scelto.  $\bigcap F$  si indica anche come  $\bigcap_{Y \in F} Y$ .

## Assioma dell'unione

Dato un insieme di insiemi, esiste l'insieme che ne è l'unione.

$$\forall F, \exists X, \forall Z, (Z \in X \iff \exists Y, (Y \in F \wedge Z \in Y))$$

L'insieme  $Y$  viene indicato con  $\bigcup F$  o  $\bigcup_{Y \in F} Y$ .

## Teorema dell'unione binaria

$$\forall A, \forall B, \exists X, \forall Z, (Z \in X \iff Z \in A \vee Z \in B)$$

Si dimostra una volta che si è dimostrata per ogni  $A$  e  $B$  l'esistenza di un insieme che contiene solo  $A$  e  $B$ .



## Assioma del singoletto

$$\forall X, \exists Y, \forall Z, (Z \in Y \iff Z = X)$$

L'insieme  $Y$  viene indicato come  $\{X\}$

## Teorema del singoletto

Anche l'assioma precedente è ridondante: può essere dimostrato a partire dall'assioma di rimpiazzamento (introdotto dopo).

## Costruzione dei numeri naturali

$$[[0]] \stackrel{\text{def}}{=} \emptyset$$

$$[[n + 1]] \stackrel{\text{def}}{=} [[n]] \cup \{[[n]]\}$$

## Esempi:

$$[[0]] = \emptyset$$

$$[[1]] = \{\emptyset\}$$

$$[[2]] = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$$

$$[[3]] = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$$

## Tutti i numeri sono diversi

Esempio: supponiamo per assurdo  $1 = 2$ .

Quindi  $\forall Z, (Z \in 1 \iff Z \in 2)$  per l'assioma di estensionalità.

Poichè  $1 \in 2$  per l'assioma dell'unione e quello del singoletto, ne deduciamo  $1 \in 1 = \{\emptyset\}$ .

Quindi  $\{\emptyset\} = 1 = \emptyset$ .

Quindi  $\forall Z, (Z \in \{\emptyset\} \iff Z \in \emptyset)$ .

Quindi poichè  $\emptyset \in \{\emptyset\}$  per l'assioma del singoletto, ne deduciamo  $\emptyset \in \emptyset$ .

Il che è assurdo per l'assioma/teorema del vuoto.

Dall'assurdo concludiamo  $1 \neq 2$ .

## Assioma dell'infinito

Esiste un insieme che contiene almeno tutti (gli encoding de)i numeri naturali.

$$\exists Y, (\emptyset \in Y \wedge \forall N, (N \in Y \Rightarrow N \cup \{N\} \in Y))$$

Indichiamo temporaneamente con  $\mathcal{N}$  tale insieme.

## Teorema: esistenza di $\mathbb{N}$

Combinando altri assioma con quello dell'infinito si arriva a dimostrare l'esistenza dell'insieme  $\mathbb{N}$  che contiene tutti e soli (gli encoding de)i numeri naturali.

## Assioma dell'insieme potenza

Esiste l'insieme dei sottoinsiemi di un insieme dato.

$$\forall X, \exists Y, \forall Z, (Z \in Y \iff Z \subseteq X)$$

Indichiamo  $Y$  come  $2^X$  o  $\mathcal{P}(X)$  (insieme potenza o insieme delle parti).

## Assioma di regolarità (o di fondazione)

Ogni insieme non vuoto ha un elemento dal quale è disgiunto.  
Fra le conseguenze: nessun insieme contiene (ricorsivamente) se stesso e ha quindi senso cercare di misurare la taglia (chiamata cardinalità) di un insieme.

## Assioma di rimpiazzamento

Intuitivamente: l'immagine di un insieme rispetto a una formula che descrive una funzione è ancora un insieme.

Intuitivamente: se  $A$  è un insieme, quindi è abbastanza piccolo, e a ogni elemento ne associo un altro, in una relazione multi-a-uno, quello che ottengo come immagine è ancora piccolo.